

**INFORMACJA DLA PACJENTÓW PO LAPAROSKOPOWEJ OPERACJI ZAŁOŻENIA
OPASKI ŻOŁĄDKOWEJ REGULOWANEJ
(LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING - LAGB)**

ODŻYWIANIE:

W dniu operacji: bez jedzenia i picia

Następny dzień: płyny (woda, mleko, herbata, rosół, kawa).

Dzień 3 do 5: potrawy półpłynne: (rzadka zupa, kompot, jogurt, potrawy dla niemowląt).

Zaczynając od 6 dnia, jeśli czujesz się na siłach, zacznij jeść małe kęsy, ALE:

1. Wybieraj potrawy, które nie są ani zbyt suche ani zbyt włókniste. W związku z tym na początku lepiej jest unikać włóknistych potraw (por, karczoch), skórek z owoców (jabłka, grejpfruty), sałat, włóknistych i suchych mięs (kurczak, indyk, wołowina), topionych serów. Jeśli w pełni przystosowałeś się do łatwo przyswajalnego pożywienia, możesz próbować jeść inne produkty. Tolerancja na nowe potrawy jest różna u poszczególnych osób. Na przykład kurczak, może być jedzony łatwo przez jednych, podczas gdy inni nie będą go mogli spożywać.
2. Na początku będziesz musiał sprawdzić, które potrawy tolerujesz, nie tylko pod względem rodzaju, ale także pod względem objętości i wielkości. Jeśli jakiś rodzaj pożywienia nie będzie dobrze przelkany, nawet po dokładnym pogryzieniu, wówczas spróbuj miksować, mielić lub siekać. Wkrótce poznasz swoje ograniczenia i będziesz co raz łatwiej dostosowywać się do nowych warunków.

INNE WSKAZÓWKI:

Miejsca, gdzie są założone szwy myj pod bieżącą wodą (krótki prysznic). Sport można uprawiać miesiąc po operacji.

8 ZŁOTYCH ZASAD (+1):

1. Jedz bardzo, bardzo powoli. Przestrzegaj tej zasady, nawet jeśli zjedzenie niewielkiej objętości zajmie Ci 45 minut.
2. Bardzo dokładnie i długo gryź.
3. Gazowane napoje (woda, soki) oraz musujące leki są całkowicie zakazane. Bąbelki gazu uwolnią się w małym żołądku, rozepchną go do dużych rozmiarów, co sprawi, że założona opaska przestanie spełniać swoje zadanie.
4. Pij pomiędzy posiłkami. Jeśli będziesz pił w trakcie jedzenia objętość płynu dodana do objętości posiłku będzie za duża dla małego żołądka.
5. Tuż przed spożyciem rozdrabniaj pożywienie na niewielkie kawałki.
6. Gdy pożywienie znajdzie się w ustach pogryź je dokładnie i połykaj powoli. Pamiętaj o sprawdzeniu stanu uzębienia, by gryzienie mogło być efektywne.
7. Przestań jeść, gdy tylko poczujesz wypełnienie żołądka. Już jedna łyżka za dużo może wywołać wymioty lub ból w okolicy założonej opaski. Może to skutkować rozepchnięciem małego żołądka, może on zamienić się w duży zbiornik a wówczas opaska przestanie pełnić swoją rolę.
8. Dwa razy w tygodniu włącz do rozkładu zajęć aktywność fizyczną, np. gimnastykę, pływanie, jazdę na rowerze, spacer, taniec.

+ 1 ZASADA: jeśli nie możesz połknąć niczego, nawet wody: niezwłocznie skontaktuj się ze swoim chirurgiem!

Kiedy średnica opaski jest zmniejszona (2 miesiące po operacji): zalecenia są takie same, lecz surowsze.

JAK UNIKAĆ NIEDOBORÓW:

Podczas okresu spadku masy ciała powinieneś odwiedzać lekarza prowadzącego co 3 miesiące lub częściej, jeśli zmniejszy się możliwość przyjmowania pokarmów lub zmieni się ich jakość. Lekarz pomoże przejść Ci przez okres zaciśnięcia opaski i spadku masy ciała, doradzi Ci jak radzić sobie z ewentualnymi niedoborami witaminowymi.

Pierwsza kontrola odbywa się sześć tygodni po operacji (lub wcześniej jeśli to konieczne). Jeśli okres spadku masy ciała jest zakończony lekarz pomoże Ci ustabilizować wagę i zrównoważyć dietę.

JAK JEŚĆ:

To nie jest książka z przepisami dietetycznymi, ponieważ 80% spadku masy ciała zależne jest od efektu przepasania żołądka. Założona opaska pozwoli Ci jeść niewiele i nie czuć głodu. Chociaż nie jesteś na ścisłej diecie musisz jeść mądrze abyś:

- tracił wagę w optymalnych warunkach
- był zdrowy i nie miał objawów niedoborów
- cieszył się jedzeniem

Próbuj jeść cztery do pięciu posiłków dziennie. Każdego dnia jedz produkty z każdej grupy pokarmowej w połączeniu z innymi rodzajami pożywienia. Jedz TROCHĘ WSZYSTKIEGO I WSZYSTKO W MAŁYCH ILOŚCIACH. Każdego dnia jedz białka zwierzęce (ryby, produkty mleczne, jajka, mięso), warzywa, rośliny strączkowe (fasola, groch, soczewica), owoce i węglowodany (makaron, ryż, ziemniaki, pieczywo, płatki śniadaniowe, produkty zbożowe, kasza manna, itp.), z dodatkiem połowy łyżki stołowej oleju na posiłek i podobnej objętości masła.

Pamiętaj, aby zawsze stosować niskotłuszczowe metody gotowania (naczynia teflonowe, gotowanie na parze, szybki kocioł, mikrofalę).

Jedzenie powinno być przyjemnością. Dlatego jeden raz w miesiącu możesz pozwolić sobie na zjedzenie tego, na co masz specjalną ochotę (tłuszcze, słodczyce).

DWA GŁÓWNE BŁĘDY, KTÓRE NIE POZWOLĄ CI SCHUDNAĆ:

1 błąd: Jeśli zrobisz puree lub będziesz miksował wszystko co jesz, pożywienie będzie płynne i nie będzie zatrzymywane przez opaskę – nie będziesz chudł! (nie jedz zup!!!)

2 błąd: jeśli będziesz jadł zbyt dużo lodów, miodu, czekolady, lub innych słodkich lub tłustych produktów rozpuszczających się w ustach, nie będą one spowalniane przez opaskę żołądkową – nie będziesz chudł!

WPROWADŹ CODZIENNE ZWYCZAJE:

Unikaj szybko spalanych cukrów: cukru stołowego, miodu, czekolady, czekoladek, cukierków, karmelków, toffi, tortów, ciast, ciastek, biszkoptów, pierników, owocowej słodkiej gumy do żucia, słodkich konfitur i dżemów, syropów owocowych, jogurtów owocowych, suszonych owoców, orzechów (migdały, orzechy laskowe, włoskie, pistacjowe), jadalnych kasztanów, budyniów, lodów, słodkich soków owocowych, napojów gazowanych, napojów alkoholowych, słodkiego skondensowanego mleka.

Unikaj ukrytych tłuszczów: pieczywa, ciastek, herbatników, prażonej kukurydzy, słodzonego skondensowanego mleka, czekolady, chipsów, smażonego pożywienia.

Unikaj tłuszczów: oleju, majonezu, masła, margaryny, śmietany, smalca, smażonego tłuszczu, metki, avocado, czarnych i zielonych oliwek, suszonych owoców i orzechów (migdały, orzechy laskowe, włoskie, pistacjowe).

ISTOTNE INFORMACJE

Warunki zakwalifikowania do operacji:

1. Chory w wieku 18 do 60 lat.
2. Indeks masy ciała BMI (waga ciała podzielona przez wzrost do kwadratu) większy od 40 lub większy od 35 z dodatkowymi obciążeniami:
 - nadciśnienie,
 - senne bezdechy,
 - stany zapalne stawów i kręgosłupa,
 - cukrzyca lub hipercholesterolemia lub hipertriglicerydemia.
3. Niepowodzenie kilkuletniego stosowania diety lub stosowania innych metod odchudzania.

Jak to działa?

- Opaska jest umieszczana podczas operacji laparoskopowej w ogólnym znieczuleniu.
- Opaska przybiera kształt pierścienia opasującego żołądek.
- Dzieli żołądek na dwa zbiorniki połączone wąskim kanałem – podobne do niesymetrycznej klepsydry z mniejszym zbiornikiem na górze.
- Kiedy pierwszy zbiornik wypełni się, będziesz się czuł syty.
- Jeśli powstrzymasz się przed jedzeniem czekolady, lodów, miodu, pić napojów gazowanych, będziesz chudł.
- Opaska może być regulowana w zależności od potrzeb. Jednakże niemożliwe jest przewidzenie ile można schudnąć, ani jakie zaciśnięcie opaski będziesz mógł tolerować.

Aby operacja przyniosła pożądane efekty:

- Nieodzwone jest, abyś zmienił swoje nawyki żywieniowe. Pamiętaj o trzech głównych zasadach, które musisz wcielić w życie:
 1. Jedz powoli,
 2. Żuj starannie by jedzenie było rozdrobnione w ustach,
 3. Gazowane płyny są absolutnie zabronione.
- Zaakceptuj fakt, że będziesz musiał być pod okresową kontrolą medyczną do końca życia, możliwe, że będziesz musiał korzystać z pomocy psychologa.
- Zaakceptuj fakt, że opaska żołądkowa jest środkiem, który pomoże Ci zmniejszyć masę ciała, ale sama, bez Twojej pomocy nie będzie wystarczająca by schudnąć tyle ile byś chciał. Zmniejszona, ustabilizowana masa ciała będzie dobrym kompromisem pomiędzy znaczną utratą masy ciała, pokarmowymi i chirurgicznymi powikłaniami oraz osobistym komfortem.

Operacja za Tobą. Dalsze wskazówki:

- Powrót do pracy po operacji za 30 dni.
- Nie będziesz odczuwał nasilonego bólu po zabiegu. Może wystąpić niewielki dyskomfort w brzuchu oraz niewielki ból w miejscu założonych szwów przez dzień lub dwa.
- Każdy epizod powtarzających się wymiotów powinien być zgłoszony Twojemu chirurgowi lub lekarzowi opiekującemu się Tobą po operacji. Wymioty mogą spowodować przesunięcie się opaski.
- Zażywanie leków przeciwzapalnych musi być bardzo ostrożne. W wypadku bólu brzucha odstaw natychmiast leki i skontaktuj się z Twoim lekarzem.

- Możliwe, że będzie potrzebne zastosowanie chirurgii plastycznej gdy przejdziesz już fazę utraty masy ciała.
- W przypadku ciąży, jeśli pojawią się wymioty, możliwe, że trzeba będzie częściowo poluznić opaskę. Można ją będzie dopełnić po porodzie. Jeśli wymioty nie pojawią się, opaskę można pozostawić bez zmian.
- Jeśli pojawią się kłopoty ze spożywaniem pewnych pokarmów możesz spróbować pić gorące napoje by odrobinę ułatwić pasaż przez opaskę.
- Możesz pić tyle wody ile chcesz między posiłkami, pamiętaj jednakże by nie pić zbyt dużo na raz, nie pić szybko, unikać napojów gazowanych i słodzonych.
- jeśli wymiotujesz jest to znak, że:
 - zjadłeś za dużo,
 - zjadłeś za szybko,
 - połknąłeś zbyt duże kęsy,
 - zbyt krótko gryzłeś,
 - zbyt szybko przelykałeś,
 - wypiliśmy zbyt dużo płynów podczas jedzenia.
- Objętość, którą możesz zjeść na każdy posiłek może być różna, zależy od twojego ogólnego stanu zdrowia, poziomu stresu, pory dnia (np. trudniej jeść rano, łatwiej wieczorem).
- Jednakże, często potrawy spożywane z pewną trudnością sprawiają największą satysfakcję.
- Jeśli będziesz odczuwał zagę skontaktuj się ze swoim chirurgiem (możliwe, że trzeba będzie poluzować opaskę).
- Przez kilka dni po zaciśnięciu opaski możliwe, że będziesz mógł spożywać tylko płyny, potem pokarmy półpłynne, a następnie powrócić do prawidłowej diety. Nadal obowiązuje 8 Złotych Zasad.
- Jeśli pokarmy przechodzą trudniej niż zazwyczaj, może być to spowodowane czasowym stresem lub zmęczeniem. Jeśli trudności te utrzymują się możliwe, że trzeba będzie poluznić opaskę.

PODSUMOWANIE

Powinieneś chudnąć powoli, bez żadnych pokarmowych ani chirurgicznych powikłań, będąc w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy powinieneś skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Jeśli wszystko będzie przebiegać dobrze powinieneś konsultować się ze swoim lekarzem co 6 miesięcy w okresie spadku masy ciała. Jest to niezbędne, by skontrolować, czy nie występują niedobory pokarmowe lub inne powikłania.